

CLINICAL AND MORPHOMETRICAL STUDIES ON GRADING OF PROSTATIC CARCINOMA

STELLINGEN

- 1 Bij patiënten die na de radicale prostatectomie positieve chirurgische snijvlakken hebben is adjuvante bestraling niet geïndiceerd.
- 2 Adjuvante hormonale therapie bij radicale prostatectomie verbetert de overleving niet.
- 3 Patiënten die een lymfklierdissectie ondergaan dienen peri-operatief geen profylactische antistollingsbehandeling te krijgen.

Kröpfl et al. Akt Urol 18: 263-268, 1987

- 4 Bij de behandeling van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom is de overleving bij totale androgeensuppressie niet beter dan na castratie alleen.

Schulze et al. J Urol 137, 909, 1987

- 5 De titer van antilichamen tegen spermatozoën speelt bij de indicatiestelling voor een hersteloperatie na vasectomie een ondergeschikte rol.
- 6 Bij de verdenking op een trauma van de urinewegen dient als eerste onderzoek een echografie te worden verricht.
- 7 De bepaling van het prostaat specifieke antigeen heeft bij de screening op prostaatcarcinoom geen waarde
- 8 Het is prematuur te veronderstellen dat het huidige opleidings-schema voor de opleiding tot uroloog niet voldoet.

- 9 Voor een goede internationale samenwerking op het gebied van de kankerbestrijding is een internationaal geaccepteerd en toegepast stageringssysteem van kwaadaardige tumoren van essentieel belang.
- 10 Gezien de politieke en economische problemen rond de toegestane vangstquota bij de vissers en de financiële consequenties daarvan, is het gezegde: "De vis wordt duur betaald" weer bijzonder aktueel.

Stellingen behorende bij het proefschrift "Clinical and morphometrical studies on grading of prostatic carcinoma"